

B. UPUTA O VMP-u

Selehold 15 mg
otopina za nakapavanje za mačke i pse $\leq 2,5$ kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/461
URBROJ: 525-10/0551-21-4
IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede

lipanj 2021.

15/22

ODOBRENO

UPUTA O VMP-u:

Selehold 15 mg, otopina za nakapavanje, za mačke i pse ≤ 2,5 kg

1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

2. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Selehold 15 mg, otopina za nakapavanje, za mačke i pse ≤ 2.5 kg
Selamektin

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Jedna pipeta sadržava:

Djelatna tvar:

	Koncentracija selamektina [mg/mL]	Selamektin [mg]	Volumen [mL]
Selehold 15 mg, otopina za nakapavanje, za mačke i pse ≤ 2.5 kg	60	15	0,25

Pomoćne tvari:


Butilhidroksitoluen (E321) 0,2 mg

Bistra, bezbojna ili žuta do smeđa otopina.

4. INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za:

Mačke i psi:

- **Suzbijanje i sprječavanje infestacije buhama**  uzrokovane s *Ctenocephalides* spp. tijekom jednog mjeseca nakon jednokratne primjene kao rezultat adulticidnih, larvicidnih i ovicidnih svojstava VMP-a, tj. djelovanja na odrasle buhe te ličinke i jajašca. VMP sprječava razmnožavanje buha kočenjem razvoja jajašaca (ovicidno djelovanje) tijekom 3 tjedna nakon primjene. Smanjenjem populacije buha, mjesečno tretiranje gravidnih životinja i životinja u fazi laktacije također pomaže u sprječavanju infestacije buhama kod mladunčadi u leglu do sedam tjedana starosti. VMP se može koristiti kao dio strategije


Selehold 15 mg
otopina za nakapavanje za mačke i pse ≤ 2,5 kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/461
URBROJ: 525-10/0551-21-4
IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede
lipanj 2021.

16/22



ODOBRENO

liječenja dermatitisa uzrokovanog alergijom na buhe te ovicidnim i larvicidnim djelovanjem može pomoći u suzbijanju postojećih infestacija buhama u područjima kojima životinja ima pristup.

- **Sprječavanje bolesti srčanog crva,**  uzrokovane s *Dirofilaria immitis*, primjenom VMP-a svaki mjesec.




- **Suzbijanje infestacije ušnim šugaracima** (*Otodectes cynotis*). 

Mačke:

- **Suzbijanje infestacije paušima** (*Felicola subrostratus*) 
- **Suzbijanje invazije odraslim stadijima crijevnih oblića** (*Toxocara cati*) 
- **Suzbijanje invazije odraslim stadijima crijevnih kukastih crva** (*Ancylostoma tubaeforme*)



Psi:

- **Suzbijanje infestacije paušima** (*Trichodectes canis*) 
- **Suzbijanje šuge ili svraba** (uzrokovane sa *Sarcoptes scabiei*) 
- **Suzbijanje invazije odraslim stadijima crijevnih oblića** (*Toxocara canis*) 

KONTRAINDIKACIJE

VMP se ne smije primjenjivati životinjama mlađim od 6 tjedana.

VMP se ne smije primjenjivati mačkama koje istodobno boluju od drugih bolesti ili su vrlo slabe ili premale tjelesne mase (za svoju veličinu i dob).

VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili bilo koju od pomoćnih tvari.

NUSPOJAVE

Primjena ovog VMP-a kod mačaka u rijetkim je slučajevima bila povezana s blagom prolaznom alopecijom na mjestu primjene. U vrlo rijetkim slučajevima također je opažena prolazna lokalna iritacija. Alopecija i iritacija obično se same povuku, ali u nekim okolnostima može biti potrebno i simptomatsko liječenje.

U rijetkim slučajevima primjena ovog VMP-a kod pasa i mačaka može uzrokovati lokalno privremeno sljepljivanje dlake na mjestu primjene i/ili povremenu pojavu male količine bijelog praha. Ova pojava je uobičajena, a obično nestane u roku 24 sata nakon primjene VMP-a te ne utječe na neškodljivost niti na učinkovitost VMP-a.

Selehold 15 mg
otopina za nakapavanje za mačke i pse $\leq 2,5$ kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/461
URBROJ: 525-10/0551-21-4
IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede

lipanj 2021.

ODOBRENO

Vrlo rijetko, kao i kod drugih makrocikličkih laktona, nakon primjene selamektina u pasa i mačaka uočeni su reverzibilni neurološki znakovi, uključujući napadaje.

U slučaju značajnog lizanja primijenjenog VMP-a, u rijetkim se slučajevima kod mačaka može opaziti kratko razdoblje pojačanog slinjenja.

Učestalost nuspojava određena je sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 životinja kojima je primijenjen VMP pokazuju nuspojavu(e))
- česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja kojima je primijenjen VMP)
- manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja kojima je primijenjen VMP)
- rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP)
- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP, uključujući izolirane slučajeve).

Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP-u, ili se posumnja u učinkovitost VMP-a, treba obavijestiti veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačka i pas (tjelesne mase $\leq 2,5$ kg)

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

VMP se primjenjuje nakapavanjem na kožu u području baze vrata, ispred lopatica.

VMP treba primijeniti jednokratno u preporučenoj dozi koja iznosi najmanje 6 mg/kg selamektina. Ukoliko se ovim VMP-om liječi više istodobnih infestacije ili invazija na istoj životinji, treba jednokratno preporučenu dozu 6 mg/kg. Odgovarajuće trajanje liječenja za pojedinu vrstu parazita navedeno je u nastavku.

VMP treba primijeniti u skladu sa sljedećom tablicom:

Mačke (kg)	Boja zatvarača pipete	Selamektin (mg)	Koncentracija (mg/mL)	Volumen (nominalna veličina pipete – mL)
$\leq 2,5$	Ružičasta	15	60	0,25
Za mačke $>2,5$ kg, molim uzeti u obzir prikladnu kombinaciju pipeta:				
2,6-7,5	Tirkizno plava	45	60	0,75
7,6-10,0	Sivo-smeđa	60	60	1,0
>10	/	Odgovarajuća kombinacija pipeta	/	Odgovarajuća kombinacija pipeta

Selehold 15 mg
otopina za nakapavanje za mačke i pse $\leq 2,5$ kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/461
URBROJ: 525-10/0551-21-4
IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede

lipanj 2021.

ODOBRENO

Psi (kg)	Boja zatvarača pipete	Selamektin (mg)	Koncentracija (mg/mL)	Volumen (nominalna veličina pipete – mL)
≤2,5	Ružičasta	15	60	0,25
Za pse >2,5 kg, treba razmotriti korištenje sljedeće pipete:				
2,6-5,0	Ljubičasta	30	120	0,25
5,1-10,0	Narančasta	60	120	0,5
10,1-20,0	Crvena	120	120	1,0
20,1-40,0	Zelena	240	120	2,0
40,1-60,0	Tamno plava	360	120	3,0
>60	/	Odgovarajuća kombinacija pipeta	/	Odgovarajuća kombinacija pipeta

Suzbijanje i sprječavanje infestacije buhama (u mačaka i pasa)



Nakon primjene ovog VMP-a odrasle buhe na životinji ugibaju, ne proizvode jajašca sposobna za život, a ličinke (koje se nalaze samo u okolini) također ugibaju. Na taj način se zaustavlja razmnožavanje buha, prekida se njihov životni ciklus i može se pomoći u suzbijanju postojećih infestacija buhama u područjima kojima životinja ima pristup.

Za sprječavanje infestacije buhama VMP treba primjenjivati u mjesečnim intervalima tijekom sezone buha, s početkom jedan mjesec prije nego buhe postanu aktivne. Smanjenjem populacije buha, mjesečno tretiranje gravidnih životinja i životinja u fazi laktacije pomoći će u sprječavanju infestacije buhama kod mladunčadi u leglu do sedam tjedana starosti.

Ukoliko se primjenjuje kao dio strategije liječenja dermatitisa uzrokovanog alergijom na buhe, VMP treba primjenjivati u mjesečnim intervalima.

Sprječavanje bolesti srčanog crva (u mačaka i pasa)



Potrebu liječenja treba utvrditi nadležni veterinar, a odluka se treba temeljiti na lokalnoj epizootiološkoj situaciji (vidjeti odjeljak 12). Za sprječavanje bolesti srčanog crva VMP treba primijeniti unutar jednog mjeseca od prvog izlaganja životinje komarcima, a nakon toga svaki mjesec sve do jedan mjesec nakon zadnjeg izlaganja komarcima. Ukoliko se propusti jedna doza i premaši mjesečni interval između doziranja, tada će žurnom primjenom VMP-a i nastavkom mjesečnog doziranja izgledi za razvoj odraslih srčanih crva svesti na najmanju moguću mjeru. Potrebu produljenja liječenja treba utvrditi nadležni veterinar. U slučaju zamjene drugim VMP-om za sprječavanje bolesti srčanog crva u sklopu programa sprječavanja bolesti srčanog crva, prva doza ovog VMP-a mora se dati unutar mjesec dana od posljednje doze prethodnog VMP-a.

Suzbijanje invazije obličima (u mačaka i pasa)



Potrebno je jednokratno primijeniti preporučenu dozu VMP-a.

Suzbijanje infestacije paušima (u mačaka i pasa)



Potrebno je jednokratno primijeniti preporučenu dozu VMP-a.

Suzbijanje infestacije ušnim šugaracima (u mačaka)



Potrebno je jednokratno primijeniti preporučenu dozu VMP-a.

Selehold 15 mg

otopina za nakapavanje za mačke i pse ≤ 2,5 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/461

URBROJ: 525-10/0551-21-4

IE/V/0394/001-003/IB/002

Ministarstvo poljoprivrede

lipanj 2021

ODOBRENO

Suzbijanje infestacije ušnim šugaracima (u pasa)



Potrebno je jednokratno primijeniti preporučenu dozu VMP-a. Otpalu prljavštinu potrebno je nježno odstraniti iz vanjskog zvukovoda za vrijeme liječenja. Preporučuje se dodatni veterinarski pregled 30 dana nakon tretiranja jer je kod nekih životinja potrebno ponoviti primjenu.

Suzbijanje invazije kukastim crvima (u mačaka)



Potrebno je primijeniti jednokratnu dozu veterinarsko-medicinskog proizvoda.

Suzbijanje šuge ili svraba (u pasa)




Za potpunu eliminaciju šugaraca, potrebno je primijeniti preporučenu dozu VMP-a tijekom dva mjeseca uzastopno.

9. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Način primjene:

1. Pipetu treba izvaditi iz pakovanja i držati u uspravnom položaju, a zatim treba zakrenuti i povući zatvarač pipete te ga skinuti.
2. Zatvarač pipete treba preokrenuti i postaviti njegov drugi kraj natrag na pipetu te ga gurnuti i zakrenuti kako bi se probušio pečat, a zatim treba skinuti zatvarač s pipete.
3. Treba razdvojiti dlaku na bazi vrata ispred lopatica tako da koža postane vidljiva. Vrh pipete treba postaviti na kožu i nekoliko puta stisnuti pipetu kako bi se u potpunosti ispraznio njezin sadržaj izravno na kožu na jedno mjesto. Treba izbjegavati kontakt između VMP-a i prstiju.



VMP se ne smije primjenjivati ako je dlaka životinje mokra. Treba izbjegavati često plivanje ili pranje životinje šamponom jer održavanje učinkovitosti VMP-a nije ispitano u takvim slučajevima.

10. KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo.

11. POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

VMP treba držati izvan pogleda i dosega djece.

VMP treba čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetla i vlage. Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na pakovanju poslije EXP. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.


Selehold 15 mg

otopina za nakapavanje za mačke i pse $\leq 2,5$ kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/461

URBROJ: 525-10/0551-21-4

IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede
lipanj 2021.
ODOBRENO

12. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

VMP se ne smije primjenjivati ako je dlaka životinje mokra. Treba izbjegavati često plivanje ili pranje životinje šamponom jer održavanje učinkovitosti VMP-a nije ispitano u takvim slučajevima. Za suzbijanje infestacije ušnim šugaracima VMP se ne smije primjenjivati izravno u ušni kanal. Važno je primijeniti preporučenu dozu VMP-a kako bi se što je moguće više smanjila količina VMP-a koju životinja može polizati.

Selamektin se može sa sigurnošću primjenjivati životinjama invadiranim odraslim srčanim crvima, ali preporučuje se, u skladu s dobrom veterinarskom praksom, da se sve životinje stare 6 mjeseci ili više koje žive u zemljama gdje postoji vektor prije početka liječenja selamektinom testiraju na postojeće invazije odraslim srčanim crvima. Također se preporučuje da se životinje periodički testiraju na invazije odraslim srčanim crvima, kao sastavni dio strategije sprječavanja invazije srčanim crvima, čak i kada se VMP primjenjuje svaki mjesec. Ovaj VMP nije učinkovit protiv odraslih jedinki *D. immitis*.

Rezistencija parazita na određenu skupinu antihelmintika može se razviti nakon česte i ponavljane upotrebe antihelmintika određene skupine.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Ovaj VMP nanosi se isključivo na površinu kože. VMP se ne smije primjenjivati kroz usta ni parenteralno.

Tretirane životinje treba držati dalje od otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja najmanje 30 minuta ili dok im se dlaka ne osuši.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

Nakon primjene VMP-a treba oprati ruke te odmah sapunom i vodom isprati VMP ukoliko je došao u kontakt s kožom. U slučaju nehotičnog kontakta s očima, odmah ih treba isprati vodom te potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

Ovaj VMP je vrlo zapaljiv te ga treba držati dalje od izvora topline, strojeva koji iskre, otvorenog plamena ili drugih izvora zapaljenja.

Ne smije se pušiti, jesti niti piti tijekom rukovanja s VMP-om.

Treba izbjegavati izravan kontakt s tretiranim životinjama sve dok se mjesto primjene ne osuši. Na dan tretiranja djeca ne smiju dirati tretirane životinje, a životinjama se ne smije dopustiti da spavaju s vlasnicima, a posebno ne s djecom. Iskorištene pipete potrebno je odmah neškodljivo ukloniti te se ne smiju ostaviti unutar pogleda ili dosega djece.

Osobe s osjetljivom kožom ili poznatom alergijom na veterinarsko-medicinske proizvode ove vrste trebaju oprezno rukovati ovim VMP-om.

Ostale mjere opreza:

Selamektin je otrovan za vodene organizme. Tretiranim psima ne smije se dozvoliti kupanje u otvorenim vodama unutar 48 sati od tretiranja kako bi se izbjegli štetni učinci na vodene organizme.

Graviditet i laktacija:

VMP se može primjenjivati rasplodnim mačkama i psima, kao i ženkama tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Tijekom opsežnog terenskog ispitivanja nisu zabilježene interakcije između selamektina i veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se uobičajeno koriste te medicinskih ili kirurških postupaka.

Selehold 15 mg
otopina za nakapavanje za mačke i pse $\leq 2,5$ kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/461
URBROJ: 525-10/0551-21-4
IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede

11. prosinac 2021.

ODOBRENO

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Nisu zabilježene nuspojave nakon primjene doze VMP-a 10 puta veće od preporučene. Selamektin je primijenjen u dozi 3 puta većoj od preporučene mačkama i psima invadiranim odraslim srčanim crvima te nisu zabilježene nuspojave. Selamektin je također primijenjen u dozi 3 puta većoj od preporučene rasplodnim mužjacima i ženka mačaka i pasa, uključujući gravidne ženke i ženke u fazi laktacije koje doje te u dozi 5 puta većoj od preporučene škotskim ovčarima osjetljivim na ivermektin (engl. *collies*) te nisu zabilježene nuspojave.

13. POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTRIJEBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada. Selamektin ne smije ući u otvorene vode jer to može biti opasno za ribe i druge vodene organizme. Spremnike i ostatke VMP-a potrebno je neškodljivo ukloniti zajedno s prikupljenim kućnim otpadom kako bi se izbjeglo onečišćenje otvorenih voda.

14. DATUM KADA JE UPUTA O VMP-u ZADNJI PUTA ODOBRENA

30. lipnja 2021. godine

15. OSTALE INFORMACIJE

Prozirna polipropilenska pipeta s jediničnom dozom sa zatvaračem od polietilena ili polioksimetilena ili polipropilena sa šiljastim vrhom, pakirana u laminiranu trostruku vrećicu koja se sastoji od poliestera, aluminijske i polietilena.

Kartonska kutija s 1, 3, 6 ili 15 pipeta.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu treba kontaktirati predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet:

KRKA-FARMA d.o.o.
Radnička cesta 48
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel: + 385 1 6312 100
E-mail: info.hr@krka.biz

Selehold 15 mg
otopina za nakapavanje za mačke i pse $\leq 2,5$ kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/461
URBROJ: 525-10/0551-21-4
IE/V/0394/001-003/IB/002


Ministarstvo poljoprivrede

lipanj 2021.

ODOBRENO